

Peräsuolen toiminnan varjoainetutkimus (defecografia)

Tutkimus ei edellytä mitään esivalmisteluja kotona.

Ilmoittaudu tutkimukseen varattuna aikana **Sairaala Novan 1. kerroksen L-lohkon** itseilmoittautumislaitteella joka ohjaa sinut kuvantamisyksikköön. Saavu Sairaala Novaan sisäänkäynti 2. kautta. Tutkimus tehdään kuvantamisen läpivalaisututkimushuoneessa.

Ilmoittautumisen jälkeen saat 2dl bariumvarjoainetta juotavaksi. Sen jälkeen naispotilaat ohjataan naistentautien- ja äitiyspoliklinikalle 3krs E-lohko jodivarjoaineeseen kastetun harsotamponin laittoon.

Jotta juotu varjoaine ehtii kulkeutua ohutsuoleen, defekografiatutkimus suoritetaan **kahden tunnin kuluttua** varjoaineen juomisesta. Tämän vuoksi varaa tutkimusta varten aikaa noin 2,5 tuntia. Ennen tutkimusta saa syödä ja juoda normaalisti. Juuri ennen kuvausta röntgenhoitaja laittaa vielä peräsuoleen varjoainetta, jonka saat ulostaa radiologin ohjeiden mukaan samalla, kun hän seuraa ulostustapahtumaa läpivalaisulla ja ottaa tarvittavat röntgenkuvat. Tutkimustulokset saatte teitä hoitavalta lääkäriltä.

Erityistä huomioitavaa

Suolisto on laitettu varjoaine voi aiheuttaa ripulia tutkimuksen jälkeen, joten varautukaa jäämään joksikin aikaa kuvantamisyksikköön ja käykää WC:ssä ennen sairaalasta poistumista. Terveyside on hyvä laittaa tutkimuksen jälkeen alushousun suojaksi.

Muuta huomioitavaa

Ota yhteys lähettävään yksikköön mikäli annettu aika ei sovi

Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä ajasta joudumme perimään erikseen määrätyn maksun.

Jos olet raskaana, olet yliherkkä röntgenvarjoaineelle tai mikäli haluat muuten kysyä jotain tutkimukseen liittyvää, voit ottaa yhteyttä kuvantamisyksikköön puh. (014) 269 2739 klo 8.00 – 15.00.