

Dosetakseli – hoito

Dexametason ohje (Kortisoni)

- Allergisten reaktioiden ehkäisemiseksi dosetakseli hoidon yhteydessä otetaan dexametason -kortisoni kuuri alla olevan taulukon mukaisesti. Sama kuuri toistuu jokaisen dosetakseli- hoidon yhteydessä.

		Dexametason 4mg
Hoitopäivää edeltävä päivä	aamu	-
	ilta	2 tablettia
Hoitopäivä	aamu	2 tablettia
	ilta	2 tablettia
2. päivä	aamu	2 tablettia
	ilta	2 tablettia
3. päivä	aamu	2 tablettia
	ilta	-

- Jos Dexametason aiheuttaa närästystä, ylävatsakipua tms. käytä vatsansuojälääkettä (esim. Somac, Omeprazol, Pantoprazol) vähintään Dexametason- hoidon ajan, tarvittaessa pidempäänkin.
- Vatsansuojälääkettä saa apteekista ilman reseptiä ja lääkäri voi kirjoittaa pyydettyessä isommasta annoksesta reseptin.

Valkosolukasvutekijä (Esim. Neulasta, Pelgraz, Lonquex, Fulphila)

- Valkosolukasvutekijäpistoksen saa pistää **aikaisintaan 24 tuntia** lääkehoidon päättymisen jälkeen.
- Voit pistää valkosolukasvutekijän itse tai varata ajan hoitajalle terveyskeskukseen hoitoa seuraavaksi päiväksi.
- Ensimmäistä pistosta varten saat lääkkeen hoitokeskuksesta. Jatkossa tilaa lääkepistos apteekkiin ennen hoitopäivää** (harva apteekki pitää lääkettä varastossa).

Pahoinvointilääkitys

- Primperan/metocolopramide 10 mg 1 tbl 1-3 kertaa päivässä -> Lääke kannattaa ottaa ½-1 tuntia ennen ruokailua
ja / tai
- Ondansetron 8 mg 1 tbl 1-3 kertaa päivässä

Lääkkeiden korvattavuus

- Lääkäri on tehnyt vastaanottokäynnillä B-lausunnon syövän hoidossa käytettävien lääkkeiden korvattavuutta varten.
- B-lausunto lähetetään sairaalasta suoraan KELA:lle.
- Kun KELA on käsitellyt lausunnon, saat postissa päätöksen ja myöhemmin uuden KELA- kortin. Korvauspäätöksen jälkeen saat Dexametasonin, Ondansetronin ja valkosolukasvutekijän reseptillä apteekista 4.50 €/ lääke.

Jos sinulla on kysyttävää ennen hoitojen aloitusta, voit soittaa Syöpätautien poliklinikalle p. 014-2691060