

EC (CE) -hoito

EC -hoito on kahden lääkkeen yhdistelmähoito. Hoidossa annettavien lääkkeiden nimet ovat epirubisiini ja syklofosfamidi. Hoito annetaan tiputuksena suoneen kolmen viikon välein. Veriarvot tarkistetaan aina ennen lääkehoitoa. Hoitokäynnille on hyvä varata aikaa n. 2 tuntia.

Epirubisiini värjää virtsasi punaiseksi, tyypillisesti 1-2 kertaa hoidon jälkeen. Epirubisiini tiputuksen aikana on tärkeää olla rauhallisesti ja pitää kättä paikallaan, koska epirubisiinissa on vakavan kudosaaurion riski, jos se menee suonen ulkopuolelle.

Tämän hoidon yhteydessä on tärkeää juoda runsaasti (n. 2 litraa), koska erityisesti syklofosfamidi lääke voi ärsyttää virtsarakkoa. Syklofosfamidi tiputuksen aikana voi sinulle tulla makutuntemuksia lääkkeestä.

EC -hoito saattaa ärsyttää verisuonia ja aiheuttaa punoitusta, tummumista ja kiristystä. Pahoinvointiriski on suurempi kuin dosetakseli hoidossa, siksi tähän hoitoon liittyy tehokkaampi pahoinvoinninelääkitys.

Pahoinvoinninelääkitys

Lääkäri on tehnyt sinulle reseptin pitkävaikutteisesta pahoinvoinnineläkkeestä Emend **tai** Akynzeo.

	Aprepitantti (Emend)	Neputitantti/Palonosetroni (Akynzeo)
Hoitopäivä pv1	125mg kapseli suun kautta n. 1 tunti ennen hoitoa	1 kapseli n. 1 tunti ennen hoitoa
pv2	80mg kapseli aamulla	(ei muita setroneja pv2 ja 3)
pv3	80mg kapseli aamulla	

Valkosolukasvutekijä (Esim. Neulasta, Pelgraz, Lonquex, Fulphila, Ziextenzo)

- Valkosolukasvutekijä pistetään aikaisintaan 24 tuntia hoidon päättymisestä.

Lääkkeiden erityiskorvattavuus

- Pahoinvoinnineläkkeet aprepitantti (Emend), yhdistelmävalmiste Akynzeo ja ondansetroni sekä valkosolukasvutekijä -pistos kuuluvat Kelan ylemmän erityiskorvattavuuden piiriin, kun lääkäri on tehnyt B-lausunnon Kelalle.