

Ibuprofeeni - postoperatiivisen kivun hoitoon

Kauppanimi

Burana® 600 mg, tabletti

Vaikuttava aine

Ibuprofeeni

Markkinoija

Orion Oyj

Annostus ja käyttöön liittyvät huomiot

Tulehduskipulääke leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon. Lääkettä voi ottaa tarvittaessa 1 tabletti 1-3 kertaa vuorokaudessa. Tabletti niellään veden kanssa.

Ibuprofeenia voi käyttää samanaikaisesti parasetamolia sisältävien kipulääkkeiden, esim. Paratabs, Panadol, Pamol sekä Panacodin (parasetamoli + kodeiini) kanssa.

Muita tulehduskipulääkkeitä ei tule käyttää ibuprofeenin kanssa samaan aikaan.

Lääkkeen käytössä tulee olla varovainen, jos saat yliherkkyysoireista asetyylisalisyylihaposta tai muista tulehduskipulääkkeistä.

Haittavaikutukset

Ibuprofeeni voi ärsyttää ruuansulatuskanavaa sekä aiheuttaa ylävatsakipua, pahoinvointia, närästystä ja ripulia. Lääkkeen käyttö lisää ruuansulatuskanavan verenvuotoriskiä, erityisesti, jos käytössä on verenhiyytymiseen vaikuttavia lääkeaineita kuten varfariini.

Lähteet

Duodecim lääketietokanta: Burana® valmisteyhteenveto