

Klotsapiinilääkitys (Leponex, Froidir)

Klotsapiinilääkitys toteutetaan aina hoitavan lääkärin tiiviissä seurannassa. Lääkärisi voi uusia lääkeresptisi vain välittömästi laboratoriokontrollin jälkeen.

Toimi siis näin:

- Käy säännöllisesti laboratoriokokeessa lääkärin ohjeen mukaan (18 ensimmäisen viikon aikana kerran viikossa ja jatkossa yleensä **neljän viikon välein**).
- Tee itse tai pyydä apteekkiasi tekemään lääkeresptistäsi **uusimispyyntö vasta laboratoriossa käynnin jälkeen**.

Klotsapiinilääkityksen turvalliseen käyttöön liittyvä laboratorioseuranta:

Verikoe B-neut kestoletetteellä.

- Otetaan säännöllisesti 4 viikon välein, mieluummin maanantai - torstai (perjantaisin vain, jos sinulla on äkillisiä infektio-oireita).
- Verikoetta ennen voit syödä ja ottaa lääkkeesi normaalisti ja näyte voidaan ottaa mihin kellonaikaan vain.

Verikoe S-Klotsa (veren lääkeainepitoisuus) otetaan lääkärin tehtyä siitä sinulle **erillisen lähetteen**.

- Muista mainita ylimääräisestä laboratoriokokeesta ennen näytteenottoa, niin molemmat näytteet voidaan ottaa samalla kertaa.
- Lääkeainepitoisuus määritetään noin 12 tuntia edellisen Leponex/ Froidir – lääkkeen ottamisen jälkeen ja tämän verikokeen yhteydessä **Leponex /Froidir aamulääke otetaan vasta verikokeen jälkeen**.
- Muut lääkkeet voit ottaa normaalisti.

Missä tilanteessa laboratorioon pitää mennä heti:

- Mikäli suu, kurkku tai nielu kipeytyy, sinulle nousee kuume tai sinulla on muita flunssan kaltaisia oireita, sinun tulee mennä heti laboratorioon ylimääräiseen B-neut kokeeseen.
- Älä ota seuraavaa Leponex /Froidir annosta ennen kuin lääkäri antaa siihen luvan.
- Ilmoita ylimääräisestä laboratoriokäynnistä omalle avohoidon työntekijällesi/poliklinikan sihteerille, joka välittää tiedon ”Leponex-hoitajalle”.

Mikäli edellä mainittuja oireita ilmenee **ilta-aikaan, viikonloppuna tai pyhäpäivinä**:

- Mene päivystykseen.
- Ilmoita vastaanottoluukulla oireesi ja kerro, että sinulla on Klotsapiini-lääkitys.
- Sinulta otetaan päivystyksellisesti laboratoriokokeet.
- Päivystyksessä saat lääkärin jatko-ohjeet liittyen laboratorioarvoihin ja Klotsapiini-lääkitykseen.