

Kohdunsuun tähyystys eli kolposkopia

Kun irtosolukokeessa tai HPV-tutkimuksessa on toistuvia tai merkittäviä muutoksia, lääkäri ohjaa Sinut kohdunsuun tähyystykseen eli kolposkopiaan naistentautien poliklinikalle. Silloin tutkitaan emätin ja kohdunsuu mikroskoopin avulla ja tarvittaessa otetaan näytepaloja. Kohdunsuun tähyystystä **ei tehdä** kuukautisvuodon aikana. Tutkimus on yleensä kivuton. Kyseessä on polikliininen käynti eikä siitä tule sairauslomaa.

Verinen vuoto saattaa jatkua seuraaviin kuukautisiin asti. Jos se muuttuu kuukautisvuotoa runsaammaksi tai ilmaantuu tulehdusoireita (hajua, kipua, kuumetta), ota yhteys joko poliklinikkaan tai omaan terveyskeskukseesi.

Vältä yhdyntää niin kauan kun on jälkivuotoa. On hyvä, että limakalvo saa parantua koepalojen ottamisen jälkeen.

Poliklinikkakäynneistä löytyy tiedot Omakannasta, jossa on tutkimusvastaukset ja jatkoseurantaohjeet, www.kanta.fi. Halutessasi saat tiedot myös kirjeitse kotiin.

Kun hoito ja seuranta poliklinikalla on ohi, käy kontrollissa sovitusti. **Luotamme siihen, että pidät huolta itsestäsi. Se on jokaisen naisen oikeus ja velvollisuus.**

Jos Sinulla on kysyttävää, **voit soittaa Naistentauti- ja äitiisyksikköön**

Puhelin 014 269 1023

Ma - Pe kello 8.00 - 15.00

Puhelin 014 269 1204 **Päivystysaikana**

Suosittelavaa lisätietoa HPV:sta ja irtosolututkimuksesta löytyy nettiosoitteesta:

<https://www.terveyskyla.fi/naistalo/gynekologinen-terveys/kohdunsuun-irtoslumuutokset-papa>