

Kohtuontelon kaavinta

Sinulle on tehty kohtuontelon kaavinta, jossa on saatettu ottaa kudospnäyte kohdun limakalvolta tutkimusta varten.

Kivun hoito

Toimenpiteen jälkeen voi olla jonkin verran kipua. Hoidoksi riittää tavallinen särkylääke (Ketorin, Burana tai jos olet allerginen, Panadol tai Para-tabs).

Lääkettä suositellaan käytettäväksi annettujen kotihoito-ohjeiden mukaisesti.

Jälkihoito

Niukkaa jälkivuotoa voi olla viikon ajan. Jälkivuodon aikana on syytä tehdä alapesu aamuin ja illoin, sekä siteen vaihdon yhteydessä. Tamponin käyttö ja sukupuoliyhdyntä on kielletty jälkivuodon ajan. Vältä amme- ja istumakylpyjä ennen jälkivuodon aikana. Vältä raskaita kotitöitä sairausloman ajan. Seuraavat kuukautiset tulevat noin 3-5 viikon kuluttua.

Jälkitarkastusta ei yleensä tarvita.

Näytevastaukset tarkistaa hoitava lääkäri ja ilmoittaa, jos niiden johdosta tarvitaan jatkoselvittelyjä.

Vastaukset on tämän jälkeen nähtävissä KANTA-arkistossa.

Mikäli voinnissasi ilmenee jotain erityistä, esimerkiksi

- alavatsan voimakkaita kipuja
- vuoto on runsasta, hyytymiä sisältävää tai siinä on hajua
- sinulle tulee kuumetta

Ota yhteyttä omaan terveyskeskukseen

tai tarvittaessa arkisin klo 8-14.00 Naistentauti- ja äitiysyksikköön, puhelin (014) 269 1023
tai synnytysvastaanottoon päivystysaikaan, puhelin (014) 269 1204