

Kohtuontelon tähyystys

Sinulle on tehty kohtuontelon tähyystys, ja kohtuontelosta on otettu näytteitä tai poistettu muutoksia.

Kivun hoito

Toimenpiteen jälkeen saattaa olla jonkin verran kipua. Kipu on voimakkaimmillaan ensimmäisten vuorokausien aikana. Hoidoksi riittää särkylääke (Ketorin, Burana tai jos olet näille allerginen, Panadol tai Para-Tabs).

Jälkihoito

Niukkaa jälkivuotoa voi olla viikon ajan. Tulehduksen välttämiseksi sen aikana:

- Tee alapesu aamuin ja illoin, ja siteen vaihdon yhteydessä. Tamponin käyttö ei ole suositeltavaa.
- Vältä ammekylpyjä, uimista ja sukupuoliyhdyntöjä.

Hoitava lääkäri tarkistaa mahdollisten näytteiden vastaukset ja ilmoittaa, jos niissä on poikkeavaa. Sen jälkeen

ne ovat nähtävissä KANTA-arkistossa.

Jälkitarkastusta ei yleensä tarvita. Tarvittaessa se voidaan sopia lähettävän lääkärin luokse tai jatkohoitojen vaatiessa naistentautien poliklinikalle.

Mikäli voinnissasi ilmenee jotain seuraavista

- alavatsan voimakasta kipua
- vuoto on runsasta tai siinä on hajua
- sinulle tulee kuumetta

Ota yhteyttä ensisijaisesti Naistentauti- ja äitiysyksikköön numeroon (014)269 1023 ma-pe klo 8.00 - 14.00 tai päivytysaikaan synnytysvastaanottoon numeroon (014)269 1204