

Kotihoito-ohje keuhkoputken täyhystyksen jälkeen (TBB)

Sinulle on tänään ____ / ____ - ____ tehty kirurgian poliklinikalla keuhkoputken täyhystys.

Tutkimuksen yhteydessä on otettu TBB- koepala (transbronkiaalibiopsia).

Toimenpiteen jälkioireiden seuranta ja hoito

Tähystyksen yhteydessä tehtyyn näytteenottoon liittyen seuramme vointiasi. Ensimmäiset kaksi tuntia tähystyksen jälkeen sinun on oltava vuodelevossa. Sen jälkeen sinulta otetaan keuhkoröntgen kuva, jolla varmistetaan, ettei näytteenotto ole aiheuttanut komplikaatioita. Mikäli keuhkokuva on kunnossa ja vointisi on hyvä, voit kotiutua sairaalasta.

Tähystyksen jälkeen et saa juoda tai syödä kahteen tuntiin nielupuudutuksen vuoksi. Jos sinulta on otettu tähystyksen yhteydessä koepaloja, suosittelemme, että vältät alkuun kuumia juomia.

Ääni voi olla käheä ja kurkku kipeän tuntuinen jonkin aikaa. Näytteiden oton vuoksi ysköksissä saattaa näkyä verta enimmillään muutamien päivien ajan.

Keuhkoputkien huuhtelun jälkeen sinulle voi ilmaantua samana iltana tai yönä ohimenevä kuumereaktio keuhkoputkiin jääneen vähäisen huuhtelunesteen vuoksi. Se on vaaratonta ja menee tavanomaisella kuumelääkkeellä ohi.

Jos sinulle on toimenpiteen aikana annettu suonon sisäistä lääkitystä, varaudu, että et saa ajaa moottoriajoneuvolla 12 tuntiin toimenpiteen jälkeen.

Toimenpiteeseen liittyvät mahdolliset komplikaatiot

Komplikaatioiden oireina voi olla joku seuraavista: hengenahdistuksen paheneminen, verenvuoto tai kuumeilu joka jatkuu seuraavana päivänä.

Mikäli sinulla kotiutumisen jälkeen esiintyy edellä mainittuja oireita, ota puhelimitse yhteys:

Keuhkosairauksien poliklinikalle arkisin ma-to klo 8–13 ja pe klo 8–12 p. 014 269 2353

Muina aikoina yhteys päivystykseen: p. 116 117. Jos saat ohjeen lähteä päivystykseen, ota tämä tiedote mukaasi.