

# Kotihoito-ohje keuhkoputken tähystyksen jälkeen

Sinulle on tänään \_\_\_\_ / \_\_\_\_ - \_\_\_\_ tehty kirurgian poliklinikalla keuhkoputken tähystys.

Jos sinulle on toimenpiteen aikana annettu suonen sisäistä lääkitystä, varaudu, että et saa ajaa moottoriajoneuvolla 12 tuntiin toimenpiteen jälkeen.

## Toimenpiteen jälkioireiden seuranta ja hoito

Tarvittaessa vointiasi seurataan 1–2 tuntia, mutta kotiutuminen on mahdollista heti tähystyksen jälkeen, jos koet vointiasi hyväksi ja hoitohenkilökunta antaa sinulle luvan kotiutua.

Tähystyksen jälkeen et saa juoda tai syödä kahteen (2) tuntiin nielupuudutuksen vuoksi. Jos sinulta on otettu tähystyksen yhteydessä koepaloja, suosittelemme, että vältät alkuun kuumia juomia.

Ääni voi olla käheä ja kurkku kipeän tuntuinen jonkin aikaa. Näytteiden oton vuoksi ysköksissä saattaa näkyä verta muutamien päivien ajan.

Keuhkoputkien huuhtelun jälkeen sinulle voi ilmaantua samana iltana tai yönä ohimenevä kuumereaktio keuhkoputkiin jääneen vähäisen huuhtelunesteen vuoksi. Se on vaaratonta ja menee tavanomaisella kuumelääkkeellä ohi. Jos kuumeilu jatkuu seuraavana päivänä, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriin.

## Toimenpiteeseen liittyvät mahdolliset komplikaatiot

Komplikaatioiden oireina voi olla joku seuraavista: hengenahdistuksen paheneminen, verenvuoto tai kuumeilu, joka jatkuu seuraavana päivänä.

Mikäli sinulla kotiutumisen jälkeen esiintyy edellä mainittuja oireita, ota yhteys puhelimitse:

Keuhkosairauksien poliklinikalle arkisin ma-to klo 8–13 ja pe klo 8–12 p. 014 269 2353

Muina aikoina yhteys päivystykseen: p. 116 117. Jos saat ohjeen lähteä päivystykseen, ota tämä tiedote mukaasi.