

Лучевая терапия области таза

Лечение проводится по индивидуально составленному плану.

Эффект лучевой терапии локальный.

Подготовка к моделированию планирования дозы и к лучевой терапии

- В мочевом пузыре всегда должно быть одинаковое количество мочи
- Помочитесь за 1 час до моделирования планирования дозы/лучевой терапии и выпейте 2 стакана воды. Не задерживайте мочу дольше и не пейте больше.
- **После этого не мочитесь до моделирования планирования дозы/лучевой терапии.**
- Следуйте этому руководству по наполнению мочевого пузыря перед моделированием планирования дозы и перед каждым сеансом лучевой терапии.

Побочные эффекты

Лучевая терапия может вызывать побочные эффекты, которые носят индивидуальный и проходящий характер:

- диарея
- запор
- метеоризм
- проблемы с мочеиспусканием
- анальное раздражение
- раздражение кожных складок и на сгибах кожи

Рекомендации по лечению побочных эффектов

Сообщите медсестре о симптомах для получения дальнейших инструкций по лечению.

Вы можете лечить диарею, запор и метеоризм лекарствами, которые можно приобрести в аптеке без рецепта, если Ваш врач не выписал Вам рецепт на лекарство.

Инструкции по уходу за кожными складками и сгибами кожи в области таза можно получить у медицинских сестер.

При необходимости Вы также можете обратиться к врачу.