

Letrozol[®]-hoito, munarakkulan kypsytyshoito eli ovulaatioinduktio

Letrozol[®] -hoito

Hoitoon voidaan tarvittaessa liittää inseminaatio.

Hoitoon ilmoittautuminen

Kun kuukautiset alkavat, varaa aika Letrozol[®] -hoidon ultraäänitutkimusta varten. Jos kuukautisvuoto alkaa perjantaina, voit aloittaa lääkkeen reseptin ohjeen mukaisesti sunnuntaina ja soittaa heti maanantaina ultraääniaikaa.

Hoitajan ajanvaraus ja soittoajat

puhelin: (014) 269 1023

ma – pe klo 8.00-14.00

Letrozol[®] on lääke, jota käytetään munarakkulan kypsyttämiseksi. Letrozol[®] -hoitoa käytetään, jos on todettu, ettei ovulaatiota tapahdu tai on kyse selittämättömästä lapsettomuudesta. Hoidon tarkoituksena on saada aikaan 1 – 2 kypsää munarakkuloa sekä ajoittaa yhdyntä tai inseminaatio ovulaation ajankohtaan.

Aloita ovulaatiotestien teko kiertopäivänä 10. Lapsettomuushoidoissa ollessasi, suosittelemme käyttämään digitaalisia ovulaatiotestejä. Testiä tehdessä tulee olla edeltävästi virtsaamatta vähintään 2 tuntia, jotta virtsassa olisi riittävä hormonipitoisuus.

Letrozol[®] aloitusannos on yleensä 2.5 mg = 1 tabletti vuorokaudessa kierron 3. – 7. päivä. Kierron 1. päivä on kuukautisten (kunnon vuodon) alkamispäivä. Ensimmäisellä kerralla ultraäänitutkimus tehdään yleensä kierron 10. – 12. päivänä. Joskus munarakkuloita kehittyy useampia, jolloin hoito keskeytetään monisikiöraskausriskin takia ja tällöin yhdyntä kielletään viikon ajaksi oman turvallisuutenne takia.

Mikäli raskaus ei ole alkanut, hoito voidaan uusia seuraavasta mahdollisesta kuukautiskierrosta.

Mikäli ovulaatiotesti on jäänyt negatiiviseksi, mahdollisesta annosmuutoksesta ja uudesta ultraäänitutkimuksesta tulee sopia puhelimitse.