

Ondansetroni - postoperatiivisen pahoinvoinnin estoon ja hoitoon

Kauppanimi

Ondansetron Stada® 4 mg, tabletti
Zofran Zydys® 4 mg, liukeneva tabletti

Vaikuttava aine

Ondansetroni

Markkinoija

Oy Stada Pharma Ab (Ondansetron Stada)
Novartis Finland Oy (Zofran Zydys)

Käyttöaiheet

Leikkauksen jälkeisen pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisy ja hoito.

Annostus ja käyttöön liittyvät huomiot

Annostelu erillisen ohjeen mukaan.

Ondansetron Stada®: Niele tabletti pienen nestemäärän kanssa.

Zofran Zydys®: Poista tabletti foliosta kuivin käsin irrottamalla ensin folion kansi ja ottamalla tabletti varovasti esiin. Älä paina tablettia folion läpi, koska se voi rikkoontua. Aseta tabletti kielen päälle, jossa se liukenee nopeasti. Niele tabletti syljen mukana.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisin haittavaikutus on päänsärky. Joskus voi esiintyä myös huimausta, rytmihäiriöitä, lämmön tunnetta, punastumista, ummetusta ja vatsakipua.

Lähteet

Duodecim lääketietokanta: Zofran Zydys® ja Ondansetron Stada® valmisteyhteenvedot