

# Pentamidiini –hoito

## Hoidon tarkoitus

Pentamidiini –hoidolla ehkäistään tai hoidetaan Pneumocystis jiroveciin aiheuttamaa keuhkokuumetta (PCP), jonka riski on suuri heikentyneen vastustuskyvyn omaavilla potilailla, mm. elinsiirtopotilaat, pahanlaatuisia verisairauksia sairastavat potilaat ja HIV-potilaat. Pentamidiini –hoito korvaa sulfahoidon sulfa–allergisilla potilailla. Vaikuttavana aineena on pentamidiini-isotionaatti (Pentacarinat® tai Nebupent®).

Hoitokerrat ja niiden aikavälit määräytyvät lähettävän lääkärin ohjeen mukaan ja ne voivat vaihdella potilaskohtaisesti.

## Esivalmistelut

Hoitopäivänä voit ottaa normaalisti säännöllisessä käytössä olevat lääkkeesi. Ota esilääke noin 5–10 min ennen varattua aikaa, jos sellainen on määrätty ja ohjattu.

## Hoidon kulku

Hoitokeskuksen hoitaja antaa pentamidiini–hoidon Kliinisen fysiologian tiloissa, 1. krs.

Ilmoittaudu tullessasi (NOVA 2 sisäänkäynti) Itseilmoittautumispisteellä joko 1. tai 2. kerroksessa. Sinut ohjataan odottamaan Odotustilaan L1 (1. kerroksessa samalla käytävällä kuin Kuvantaminen).

Yksi hoitokerta kestää noin 20–40 minuuttia.

Hoidon ajan istut läpinäkyvässä suojakaapissa ja hengität ohjeen mukaan pentamidiini –lääkettä sumutteena, kunnes lääkesumutin on tyhjentynt.

## Mahdolliset haittavaikutukset

Pentamidiini –hoito saattaa aiheuttaa pahaa makua suussa sekä paikallisreaktiota hengitysteiden alueella, kuten yskää, hengenahdistusta ja keuhkoputkien supistumista, erityisesti astmaatikoilla ja tupakoivilla. Harvoin sekavuutta.

## Erityistä huomioitavaa

Raskaana olevien, tai raskaaksi aikovien naisten ei tulisi altistua pentamidiinille.

## Yhteystiedot

Ole tarvittaessa yhteydessä lähettävälle poliklinikalle