

Alaraajojen / yläraajojen venografiatutkimus (laskimoverisuonten varjoainekuvaus)

Sinulle on varattu aika laskimoverisuonten varjoainekuvaukseen Sairaala Novan kuvantamisyksikössä.

Saapuessasi sairaalaan ilmoittaudu kutsukirjeessä saamasi ohjeistuksen mukaisesti.

Toimenpiteen esivalmistelujen jälkeen sinut viedään kuvantamiseen toimenpiteeseen. Toimenpide tehdään nivus- tai kyynärtaipeesta paikallispuudutuksessa. Ohut katetri ohjataan laskimon kautta haluttuun kohtaan, ruiskutetaan varjoainetta ja kuvataan. Varjoaine aiheuttaa lyhytaikaisen lämmöntunteen, muuten toimenpide on lähes kivuton. Tarpeen vaatiessa voidaan samassa yhteydessä tehdä toimenpide, esimerkiksi pallolaajennus. Jälkihoito tapahtuu samassa yksikössä, jossa tehdään esivalmistelut.

Toimenpiteeseen valmistautuminen

- Ohessa laboratoriolähete, käy verikokeessa valitsemassasi Fimlabin laboratoriossa kahden viikon sisällä ennen toimenpidettä, kuitenkin viimeistään kaksi arkipäivää ennen toimenpidettä.
- Mikäli sinulla on käytössä Marevan- tai Warfarin lääkitys, käy toimenpidettä edeltävänä päivänä laboratoriossa, jossa otetaan INR.
- Mikäli sinulla on käytössä **verenhennuslääkitys, on lääkitys tauotettava ennen toimenpidettä**. Saat tauotusohjeet lähettävästä yksiköstä. Toimenpiteen jälkeen verenhennuslääkitys jatkuu normaaliin tapaan. Tauotettavia lääkkeitä ovat esimerkiksi Marevan, Warfarin, Efiend, Eliquis, Pradaxa, Tiklyd, Lixiana tai Xarelto.
- Mikäli sinulla on käytössä **metformiinia sisältävä diabeteslääke, on lääkitys pidettävä tauolla 2 vrk ennen ja 2 vrk jälkeen varjoainekuvauksen**. Tästä lyhyestä tauosta ei ole haittaa. Tauotettavia lääkkeitä ovat Eucreas, Glucophage, Janumet, Jentadueto, Komboglyze, Metforem, Metformin, Oramet, Segluromet, Synjardy, Velmetia tai Xigduo.
- Mikäli munuaistautilääkäri on määrännyt sinulle Mucomyst-lääkkeen, ota se ohjeen mukaan.
- **Ota muut käyttämäsi lääkkeet normaalisti toimenpidepäivän aamuna.**
- **Ota mukaasi käyttämäsi reseptilääkkeet.**

- Mikäli sinulla on sydämen keinoläppä, olet yliherkkä jodivarjoaineelle tai olet raskaana, ota yhteys lähettävään yksikköön.
- **Toimenpidepäivänä tulee olla syömättä ja juomatta 4 tuntia ennen toimenpidettä.** Lääkkeet voit ottaa pienen vesimäärän kanssa. Mikäli sinulla on insuliinihoitoinen diabetes, ota yhteys lähettävään yksikköön.
- **Autolla ajaminen on kielletty** toimenpidepäivänä.
- Mikäli olet yliherkkä lääkaineille, mainitse tästä henkilökunnalle saapuessasi toimenpiteeseen.

Jälkihoito

Katetrin poistamisen jälkeen pistokohtaa painetaan vähintään 20 minuuttia. Olet kaksi (2) tuntia vuodelevossa ja kaikkiaan neljä (4) tuntia seurannassa toimenpiteen jälkeen. Olet tarvittaessa seurannassa seuraavaan aamuun. Tutkimuksen jälkeen tulee nauttia runsaasti nesteitä kahden (2) vuorokauden ajan, näin varjoaineen poistuminen elimistöstä nopeutuu.

Hoito kotona

Kotona tulee välttää raskaiden taakkojen nostelua ja rajua liikuntaa sekä saunomista viikon ajan toimenpiteen jälkeen. Saat kuvantamisyksiköstä ohjeet kuinka toimia jos myöhemmin ilmenee toimenpiteeseen liittyviä ongelmia, esimerkiksi pistokohdan verenvuotoa, kipua, turvotusta tai allergista ihottumaa.

Muuta huomioitavaa

Ota yhteys lähettävään yksikköön puh. _____/Sairaala Novan puhelinvaihteeseen puh. (014) 269 1811, mikäli:

- sinulla on sydämen keinoläppä
- haluat kysyä verenohennuslääkityksen tauotuksesta
- haluat kysyä insuliinihoitoisen diabeteksen hoidosta
- olet raskaana
- olet yliherkkä jodivarjoaineelle
- **sinulle annettu aika ei sovi. Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä ajasta joudumme perimään erikseen määrätyn maksun.**

Ota yhteys kuvantamiseen puh. (014) 269 1248 klo 8.00–14.30, mikäli:

- haluat kysyä jotain tutkimukseen liittyvää