

Suolistoverenvuodon gammakuvaus

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoitus on todeta mahdollinen suolistokanavaan tapahtuva verenvuoto ja sen paikka.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimuspäivänä saatte syödä ja juoda normaalisti sekä ottaa teillä käytössä olevat lääkkeet.

Tutkimusta ei tehdä raskaana oleville.

Tutkimuksen kulku ja kesto

Tutkimusaineen kiinnittymistä punasoluihin tehostava lääkeaine injisoidaan verenkiertoon suonikanyylin kautta. 20 - 40 minuutin kuluttua injisoidaan radioaktiivinen tutkimusaine verenkiertoon ja aloitetaan kuvaus välittömästi.

Kuvaus tehdään selinmakuulla, gammakamera vatsan yläpuolella. Vatsan aluetta kuvataan tunnin ajan. Kuvauksen aikana tulee olla mahdollisimman paikallaan. Tarvittaessa voidaan ottaa vielä lisäkuvia. Lisäkuvien tarpeellisuudesta päättää lääkäri. Viimeinen kuvaus voidaan tarvittaessa tehdä seuraavana päivänä. Tunnin kuvuksen jälkeen pääsette jaloittelemaan.

Tutkimusaineesta ei tule sivuvaikutuksia eikä se aiheuta rajoituksia itselle tai ympäristölle.

Tutkimukseen on hyvä varata aikaa koko päivä. Mahdollisesti seuraavana päivänä tehtävä kuvaus vie aikaa n. 20 minuuttia.

Tutkimuksen jälkeen

Tutkimuksen jälkeen tulee juoda normaalia runsaammin ja tyhjentää rakkoa tiheästi, jotta radioaktiivinen tutkimusaine poistuisi elimistöstä nopeammin.

Pitkäkestoista lähikontaktia pienten lasten ja raskaana olevien naisten kanssa on syytä välttää yhden vuorokauden ajan.

Tutkimuspaikka

Kliininen fysiologia ja isotooppitutkimukset, 1.kerros, Keski-Suomen Sairaala Nova. Sisäänkäynti 2.

Ilmoittaudu tutkimukseen viimeistään 15 minuuttia ennen tutkimusaikaa 1.kerroksessa L-lohkon itseilmoittautumisautomaatilla.

Jos on kysyttävää tai tulee äkillinen este, ota yhteyttä ma-to klo 7-15 ja pe 7-13 puh. 014 269 1263