

## Vepesid® 50 mg

Tässä ohjeessa neuvotaan etoposidi (Vepesid®) kapselien ottaminen syöpälääkehoidon yhteydessä.

### Annostus ja antotapa

Ota Vepesid® -kapselit tyhjään vatsaan. Edeltävästä ateriasta tulee olla kulunut kaksi tuntia. Tunnin päästä kapselien ottamisesta voit syödä. Yli 200 mg:n annokset jaetaan 2(-4) antokertaan. Annostelu on merkattu alla olevaan taulukkoon.

Vepesid® suun kautta päivinä 1–3

		annos kapseleina	otettu merkintä
pv 1	Aamu (sairaalassa)		
	Ilta		
pv 2	Aamu		
	Ilta		
pv 3	Aamu		
	Ilta		

Vepesid® suun kautta päivinä 2–3

		annos kapseleina	otettu merkintä
pv 1	suonen- sisäisesti		
pv 2	Aamu		
	Ilta		
pv 3	Aamu		
	Ilta		

### Pahoinvoinnin estolääkitys

Voit ottaa sinulle määrätyn pahoinvoinnineläkkeen (esim. Metoclopramide®, Ondansetron®, Dexametason®) noin puoli tuntia ennen Vepesid® kapselien ottamista.

pv	lääke ja vahvuus	annos	lisätieto

### Säilytys ja käsittelyohje

Lääkkeet saat reseptillä apteekista. Säilytä kapselit huoneenlämmössä alkuperäispakkauksessa. Käsitellessäsi kapseleita suosittelemme käsineiden käyttöä ja käsien pesua saippualla ja vedellä kapseleiden käsittelyn jälkeen. Varoaika lääkeaineen erittymisessä virtsaan on 4 vuorokautta ja ulosteeseen 7 vuorokautta.